

### **Łąka w Doninie przed pierwszym koszeniem w 2023 r.**

Drugi rok po założeniu nowej łąki kwietnej jest zawsze pełen oczekiwaniami, zwłaszcza na początku sezonu wegetacyjnego. Osoby zainteresowane takim projektem często zadają sobie pytanie, czy i jak łąka będzie kwitnąć i jak będzie wyglądać. I jak to często bywa, oczekiwania są często nieco idealistyczne i może po nich nastąpić lekkie rozczarowanie. W drugim roku po założeniu łąka nie zawsze jest tak kolorowa jak miejskie murawy wysianych roślin jednorocznych. Tak jest również w przypadku badanej lokalizacji w Doninie.

Na początku lata miejscami dominowała tu koniczyna, ale przede wszystkim trawy - rajgras wyniosły, wyczyniec łąkowy i kupkówka pospolita. Ponieważ ich źdźbła osiągnęły wysokość do 130 cm, kwitnące pod nimi rośliny nie są zbyt widoczne. Oprócz wspomnianych koniczyn, pojawił się również Komonica zwyczajna, biała stokrotka, krwawnik pospolity i dzwonek rozpierzchły. Na pierwszy rzut oka roślinność wygląda nijako i monotennie, ale trzeba przyrzeć się jej bliżej i bardziej szczegółowo. Fakt, że łąka musi być koszona stosunkowo późno, w połowie lipca, również przyczynia się do tego wrażenia niskiej kolorystyki, co dla niektórych mogło być nieco rozczarowujące w stosunku do oczekiwań. Wynika to z faktu, że zioła kwitnące w podszycie łąki kwitną później i potrzebują czasu na dojrzewanie nasion, aby mogły się dalej rozmnażać kosztem traw, co powinno sprawić, że łąka będzie bardziej kolorowa i atrakcyjna wizualnie w przyszłych latach.

Niepożądane gatunki ruderalne, takie jak ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna i szczaw kędzierzawy, są również obecne lokalnie. Na szczęście jest ich niewiele i konieczne będzie mechaniczne wyeliminowanie ich ognisk poprzez odchwaszczanie przed skoszeniem całego obszaru.



Zdjęcie: Petra Šilberská

**Kooperční síť "Kvetoucí louky" / *Sieć współpracy "Kwitnące Łąki"***  
**CZ.11.4.120/0.0/0.0/20\_032/0002849**